

La hernie périnéale chez le chien



La hernie périnéale est une condition affectant essentiellement les chiens et consiste en un déplacement de certains organes abdominaux (colon, rectum, petit intestin, vessie ou graisse) dans la région entourant l'anus et appelée périnée.

Cette condition est causée par un affaiblissement progressif des muscles constituant le diaphragme pelvien. La cause de cette pathologie n'est pas encore totalement connue, mais la grande majorité des cas sont des chiens mâles non castrés d'âge moyen ou âgé.

Signes cliniques

Les signes cliniques sont des difficultés à uriner ou à émettre les selles, constipation, et gonflement autour de la région anale. Si la vessie se situe dans la hernie, l'animal ne peut alors plus uriner et cela constitue alors une urgence.

Diagnostic

Le diagnostic est réalisé lors de l'examen clinique. Un examen de la région anale et une palpation rectale digitée permettent de mettre en évidence la hernie et de déterminer si la hernie est présente d'un seul côté (unilatérale) des deux côtés (bilatérale). Des radiographies et/ou une échographie vont également permettre de déterminer les tissus ou les organes présents dans la hernie.

Traitement

Le traitement chirurgical consiste à réaliser une transposition d'un muscle afin de reconstruire le diaphragme pelvien, généralement le muscle obturateur interne. D'autres techniques peuvent être réalisées en complément pour augmenter le taux de succès de la chirurgie notamment lorsque la hernie est sévère ou bilatérale :



La colopexie : le colon est fixé à la paroi abdominale pour éviter qu'il exerce une pression sur le muscle obturateur interne transposé et hernie de nouveau



La cystopexie : la vessie est fixée à la paroi abdominale dans le même but



La castration qui est toujours réalisée (car diminue le risque de récidence)

Pronostic

Fiche clinique - Chirurgie

Le taux de succès de la chirurgie est d'environ 80-90%. Il va dépendre de différents facteurs, notamment de la sévérité de la hernie, de la technique utilisée et de l'expérience du chirurgien. Des complications peuvent survenir suite à ce type de chirurgie comme une infection, une récurrence, un inconfort passager lors de l'émission des selles et une incontinence urinaire et fécale qui sont généralement transitoires.



CENTRE VÉTÉRINAIRE
DMV